

ALLEGATO 2

MODALITA' DI PREPARAZIONE PER LA COLONSCOPIA DI SCREENING CON MACROGOL/ACIDO ASCORBICO

Nei 5 giorni precedenti l'esame seguire una dieta priva di fibre (frutta, verdura, legumi, patate, crusca) evitando in particolare alimenti che contengono semi.

Il giorno prima dell'esame assumere una dieta liquida con piccolo spuntino senza fibre, a pranzo.

Nei soggetti con stipsi cronica e uso abituale di lassativi (anche erbe e tisane): iniziando da 4 giorni prima della data dell'esame, assumere 4 compresse di **Dulcolax** al giorno per 3 giorni.

SE L'ESAME E' PROGRAMMATO PER IL MATTINO

Alle ore 18.00 del giorno precedente l'esame: sciogliere le due buste A e B del **macrogol** (Moviprep), contenute nel sacchetto trasparente, in un litro d'acqua e bere la soluzione nell'arco di 1 – 2 ore

Alle ore 21.00 del giorno precedente l'esame: sciogliere le altre due buste A e B del **macrogol** (Moviprep), contenute nel secondo sacchetto trasparente, in un litro d'acqua e bere la soluzione nell'arco di 1 – 2 ore

Durante la preparazione, si raccomanda di bere un ulteriore ½ litro di acqua naturale dopo ciascuna delle due assunzioni della soluzione di Moviprep.

SE L'ESAME E' PROGRAMMATO PER IL POMERIGGIO O PER LA TARDA MATTINATA (dopo le 12.00)

Alle ore 21.00 del giorno precedente l'esame: sciogliere le due buste A e B del **macrogol** (Moviprep), contenute nel sacchetto trasparente, in un litro d'acqua e bere la soluzione nell'arco di 1 – 2 ore

Alle ore 7.00 del giorno dell'esame: sciogliere le altre due buste A e B del **macrogol** (Moviprep), contenute nel secondo sacchetto trasparente, in un litro d'acqua e bere la soluzione nell'arco di 1 – 2 ore

Durante la preparazione, si raccomanda di bere un ulteriore ½ litro di acqua naturale dopo ciascuna delle due assunzioni della soluzione di Moviprep.

NOTA BENE

- qualora il soggetto è affetto da una malattia valvolare cardiaca ad alto rischio di endocardite è indispensabile una profilassi antibiotica con : **Amoxicillina 2gr in somministrazione unica due ore prima dell'esame (in caso di allergia: Eritromicina 1 gr)**.
- dal momento in cui si inizia la procedura di preparazione non deve essere assunto alcun cibo solido
- sospendere Aspirina o farmaci antiaggreganti piastrinici una settimana prima dell'esame; adottare la procedura di sostituzione del Coumadin con Eparina chiedendo consiglio al medico di famiglia o al cardiologo di fiducia

In caso di dubbio sulle modalità della preparazione alla colonscopia contattare il centro di Endoscopia digestiva dove è stato prenotato l'esame.

Il farmacista spedisce le ricette recanti la prescrizione del prodotto per la preparazione alla colonscopia, opportunamente contrassegnate con il codice D04, con oneri a carico del SSR; il prezzo di rimborso alla farmacia per la fornitura di tali prodotti è pari a euro 14.