

Lo screening dopo 10 anni: a che punto siamo?

IL SECONDO E TERZO LIVELLO DELLO SCREENING DEL CANCRO
COLO-RETTALE: PARLIAMONE
9 ottobre 2015

Sala Convegni del Nuovo Ospedale di Cona
in Via Aldo Moro n.8 – Cona (FE)




Carlo Naldoni (ONS)
Stefano Ferretti (Regione Emilia-
Romagna)

Programmi di screening colorettaie per anno di attivazione


Popolazione
italiana 50-69
anni:
14.995.951

Invitati
4.362.918


Screenati
2.036.697




Popolazione ISTAT, popolazione target, invitati e screenati ITALIA 2005 - 2013




Popolazione ISTAT, popolazione target, invitati e screenati NORD 2005 - 2013




Popolazione ISTAT, popolazione target, invitati e screenati CENTRO 2005 - 2013




Popolazione ISTAT, popolazione target, invitati e screenati SUD – ISOLE 2005 - 2013




Estensione teorica dei programmi di screening al 31.12.2013




Estensione effettiva degli inviti al 31.12.2013



Estensione effettiva degli inviti per Regione




Persone 50-69enni che hanno riferito di aver eseguito un esame per la prevenzione dei tumori coloretali nei tempi raccomandati* (%) (n. 41.373)



* Il dato relativo al Piemonte viene calcolato con un algoritmo apposito che tiene conto delle diverse modalità di organizzazione dello screening (rettosigmoidoscopia a 58 anni o in alternativa ricerca del sangue occulto ogni due anni nella fascia 59-69 anni).


Persone 50-69enni che riferiscono di aver eseguito un esame per la ricerca dei tumori colorettali nei tempi raccomandati* (%)



La copertura è complessivamente in crescita in tutte le macroaree, in particolare al Nord e al Centro (aumento del differenziale)


Primi esami – Test positivi standardizzati per Regione

(media, 10° e 90° percentile)




Esami successivi – Test positivi stand. per Regione

(media, 10° e 90° percentile)



Standard accettabile $\leq 4.5\%$ desiderabile $\leq 3.5\%$

Adesione alla colonscopia




Standard accettabile > 85%, desiderabile > 90%

Colonscopia complete*


(media, 10° e 90° percentile)

2013



* Includere colonscopie completate in momenti successivi ma comunque entro i 6 mesi dalla colonscopia indice

Tempo per l'esecuzione della colonscopia di approfondimento




Standard accettabile >90% entro 30 gg, desiderabile >95% entro 30 gg

Use of colonoscopies in the clinic practice

Esami di sorveglianza eseguiti come successivi a colonscopia di screening programmatico: 204 (25%)

Colonscopie eseguite ad intervallo di sorveglianza appropriato (± 6 mesi) in esami eseguiti in programmi regionali di screening :



CCR: Programmi che hanno fornito i dati sui migranti

Numero programmi:


85

Popolazione residente
50-69 anni:

8.390.483

Popolazione residente
50-69
interessata:


55,9%



CCR: Dati principali 2013


2013	Italiani	Migranti
Invitati	3 099 822	192 629
% Inviti inesitati	56 791 (1,8%)	19 693 (<u>10,2%</u>)
Aderenti	1 556 647	60 223
Adesione grezza	51,3	34,3
Positivi	71 864	2 634
Inadeguati	0,30%	<u>0,54%</u>

Migranti invitati allo screening




CCR

% Stranieri screenati




CCR

Tasso di adesione all'invito




CCR

Screenati per fasce d'età



CCR


Distribuzione per episodio di screening



CCR


Adesione corretta per Regione

Migranti
Italiani




CCR

Tasso di positività per episodio di screening e nazionalità (standardizzato per sesso e per età)



CCR

Tasso di adesione corretta alla colonscopia



Conclusioni 1

- Prosegue l'estensione
- Criticità al sud

Conclusioni 2

- ❑ nello screening colorettales la quota di migranti è ancora molto contenuta
- ❑ l'adesione è minore rispetto alla popolazione italiana anche se in alcune realtà il dato è quasi sovrapponibile
- ❑ Criticità: quota di inesitati
- ❑ un programma performante produce maggiore adesione anche nella popolazione migrante e quindi una maggiore equità di accesso
- ❑ l'adesione all'approfondimento è buona!
 - Segnala l'adeguatezza delle modalità di accesso agli approfondimenti anche alle esigenze della popolazione migrante
- ❑ nello screening colorettales complessivamente non emergono criticità legate ad un maggior rischio di malattia nei migranti

**IL SECONDO E TERZO LIVELLO DELLO SCREENING DEL CANCRO
COLO-RETTALE: PARLIAMONE
9 ottobre 2015**

**Sala Convegni del Nuovo Ospedale di Cona
in Via Aldo Moro n.8 – Cona (FE)**




**GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE**

	SCREENING	COLON-RETTO 50-69 anni	
RESIDENTI		Estensione degli inviti corretta	Adesione all'invito corretta
PC		88,9	52,3
PR		82,2	54,8
RE		96,8	65,9
MO		90,4	54,8
BO		98,4	50,5
IMO		90,9	57,3
FE		98,1	54,1
RA		98,4	59,4
FO		84,2	45,0
CES		86,5	54,8
RN		90,7	53,6
Regione		92,7	54,8


	SCREENING	COLON-RETTO 50-69 anni	
DOMICILIATI		Estensione degli inviti corretta	Adesione all'invito corretta
PC		50,8	40,9
PR		64,8	39,2
RE		92,6	42,5
MO		74,0	38,2
BO		91,8	47,1
IMO		90,3	25,3
FE		81,0	43,8
RA		90,5	31,6
FO		41,4	32,6
CES		70,7	39,1
RN		74,4	43,5
Regione		79,6	42,6

Adesione all'invito corretta 2013



Trend temporale dell'estensione


- Estensione corretta degli inviti per anno, RER 2005-2013



Estensione non reale poiché sottostimiamo degli esclusi prima per test recente per effetto della perdita del dato nel tracciato record

Trend adesione all'invito

- Adesione corretta all'invito per anno, totale inviti RER 2005-2013



[persone che eseguono il FOBT/(persone invitate - inviti inesitati - esclusione per test recente)]%


Standard di riferimento

Accettabile > 45%

Desiderabile > 65%

Test positivi - 2013

- Proporzione standardizzata* per età e sesso delle persone con test positivo specifica per AUSL, primi esami RER



(persone con test di screening positivo/persone con test di screening adeguato)%

* Popolazione standard totale regionale

Italia 2013 5.5%


Standard di riferimento

Accettabile < 6%

Desiderabile < 5%

Test positivi - 2013

- Proporzione standardizzata* per età e sesso delle persone con test positivo specifica per AUSL, esami successivi RER



(persone con test di screening positivo/persone con test di screening adeguato)%

* Popolazione standard totale regionale

Italia 2013 4.4%


Standard di riferimento

Accettabile < 6%

Desiderabile < 5%

Adesione alla colonscopia - 2013

- Adesione (%) alla colonscopia specifica per AUSL, totale esami RER



(persone che eseguono l'approfondimento/persone invitate a eseguire approfondimento)%*

*** NON SONO STATE INSERITE LE PERSONE CHE ESEGUONO LA COLONSCOPIA ALTROVE**

Italia 2013 81.7%


Standard di riferimento

Accettabile > 85%

Desiderabile > 90%

Trend adesione alla colonscopia

- Adesione (%) alla colonscopia per anno, totale esami RER 2005-2013



(persone che eseguono l'approfondimento/persone invitate a eseguire approfondimento)%*

*** NON SONO STATE INSERITE LE PERSONE CHE ESEGUONO LA COLONSCOPIA ALTROVE**


Standard di riferimento

Accettabile > 85%

Desiderabile > 90%

Colonscopie complete - 2013

- Proporzione colonscopie complete specifica per AUSL, totale esami RER



(persone con almeno un esame completo/persone che effettuano la colonscopia)%

Italia 2013 95%

Standard di riferimento

Accettabile > 85%

Desiderabile > 90%