

SCHEMI DI FOLLOW-UP

Studio GISCOR - Rectum

**SCHEMA FOLLOW-UP
PER POLIPO MALIGNO A BASSO RISCHIO**

ESAME	MESE 0	MESE 3	MESE 6	MESE 12	MESE 18	MESE 24	MESE 36	MESE 48	MESE 60
VISITA CLINICA*	X	X	X	X	X	X	X		X
CEA**	X		X	X	X	X	X		X
ECO/TAC- ADDOME	X			X		X			X
ENDOSCOPIA	X	X		X			X		X
EcoEndoscopia (solo retto)***	X	X		X					
Rx- TORACE	X			X					X

- La visita clinica è obbligatoria mentre gli esami possono essere programmati con diversa tempistica a giudizio del ricercatore clinico, purchè adeguatamente registrati.
- ** L'esecuzione del CEA durante il follow up è a discrezione dei Centri in base al valore iniziale.
- *** La eco-endoscopia è eventualmente sostituibile con TC/RM pelvica.

**SCHEMA FOLLOW-UP
PER POLIPO MALIGNO AD ALTO RISCHIO**

ESAME	MESE 0	MESE 3	MESE 6	MESE 12	MESE 18	MESE 24	MESE 36	MESE 48	MESE 60
VISITA CLINICA*	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CEA**	X		X	X	X	X	X	X	X
ECO/TAC- ADDOME	X		X	X	X	X	X	X	X
ENDOSCOPIA	X	X		X			X		X
ECOENDOSCOPIA (solo retto)***	X	X		X		X			
Rx- TORACE	X			X		X			X

- La visita clinica è obbligatoria mentre gli esami possono essere programmati con diversa tempistica a giudizio del ricercatore clinico, purchè adeguatamente registrati.
- ** L'esecuzione del CEA durante il follow up è a discrezione dei Centri in base al valore iniziale.
- *** La eco-endoscopia è eventualmente sostituibile con TC/RM pelvica.

SCHEMA FOLLOW-UP

pT1-2 pN0 (Dukes A)

ESAME	MESE 0	MESE 3	MESE 6	MESE 12	MESE 18	MESE 24	MESE 36	MESE 48	MESE 60
VISITA CLINICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CEA	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ECO/TC addome mdc	X			X		X	X	X	
ENDOSCOPIA	X			X		X	X		X
ECOENDOSCOPIA	X								
RX torace	X			X		X		X	X

SCHEMA FOLLOW-UP Adk “localmente avanzato”

(y) pT3 (y) pN 0 (Dukes B) e (y) pT1-2-3 (y) pN + (Dukes C)

ESAME	0	3	6	12	18	24	36	48	60
VISITA CLINICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CEA	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ECO/TC addome mdc	X		X	X		X	X	X	X
PANCOLONSCOPIA <i>a: rettosigmoidoscopia</i>	X	(X)^a		X		X	X		X
ECOENDOSCOPIA	X								
RX torace	X		X	X		X	X	X	X

Principi generali

- Le evidenze di efficacia del follow-up sono limitate
- La decisione specifica sul tipo di follow-up da attuare nel singolo caso dipende anche dalla volontà del paziente
- Un follow-up di “media intensità” è generalmente ben accolto dal paziente